



Ką turite žinoti po dantų šaknų kanalų (endodontinio) gydymo?

Skausmas po endodontijos:

- 1-3 dienas galimas stiprus skausmas;
- 1-2 savaites galimas vidutinis skausmas;
- Skausmui malšinti vartokite bet kurį Jums tinkantį vaistą ("Ibuprofen", „Ketanov“, „Nimesil“, „Dolmen“) tol, kol skauda, 2–3 kartus per dieną keletą dienų.
- Skalaukite skalavimo tirpalais (pvz., 0,2% chlorheksidinu). Skalaukite keletą dienų.

Jautrumas sukandant dantis:

- 1-3 dienas galimas stipresnis jautrumas valgant, kramtant, sukandant dantis;
- 1-6 mėnesiai galimas lengvas jautrumas sukandant.

Patinimas.

Patinimas būna nuo minimalaus iki akivaizdžiai matomo ir priklauso nuo individualių organizmo savybių ir procedūros apimties. Didžiausias patinimas būna antrą trečią parą po procedūros.

Jeigu turėjote uždegiminį, supuliovusį, nešvarų dantį (danties šaknis) - galimas patinimas, priklausomai nuo situacijos, Nuo 1 dienos iki 1 savaitės. Tokiu atveju Jūs turite vartoti Jums paskirtus vaistus bei laiku atvyti suplanuotoms procedūroms, nes tokio danties gydymas yra kompleksinis ir susideda iš didesnio kiekio vizitų, kurių metu yra keičiami vaistai tol kol pasveiks dantis ir nyslūgs patinimas/pūliavimas. Kartais reikalingas ir chirurginė intraoralinė intervencija pūlių sankaupų pašalinimui.

Jeigu Jums paskirti antibiotikai, nurodytą dozę reikia gerti 2 kartus per dieną, 7 dienas;